

## Čo je Nyxoid®?

Nyxoid® je jednodávkový nosový sprej na núdzové použitie pri predávkovaní opioidmi (ako je heroín, metadón, fentanyl, oxykodón, buprenorfín alebo morfín). Každé balenie obsahuje **2 spreje (2 jednorazové dávky)**.

Nyxoid® neslúži ako náhrada za lekársku starostlivosť prvej pomoci.

Nyxoid® by mal so sebou nosiť každý, komu hrozí predávkovanie opioidmi. Opatrovatelia ako blízka rodina alebo priatelia by mali vedieť, kde nájsú Nyxoid v prípade núdze.

## Kedy použiť Nyxoid®

Ak viete alebo máte podozrenie, že sa niekto predávkoval opioidmi, použite Nyxoid® podľa návodu na opačnej strane tohto letáka.

**! VŽDY bezodkladne privolajte RZP**, dokonca aj vtedy, keď sa postihnutý preberie. Znova môže totiž stratiť vedomie a prestať dýchať.


**! Dávajte si pozor:** u osoby, ktorej bol podaný liek Nyxoid® sa môžu vyskytnúť akútne abstinenčné príznaky, ktoré môžu byť nebezpečné.

## Ak nosíte Nyxoid®...

Zapíšte si do kalendára pripomienku 1 mesiac pred uplynutím dátumu expirácie lieku Nyxoid®, ktorý máte. Potom si zariadenie vymenu za nové.

## Ako Nyxoid® účinkuje?

Nyxoid obsahuje **naloxón**, ktorý dočasne zvráti účinok opioidov. Naloxón vytesňuje molekuly opioidov z príslušných receptorov v mozgu a tele.



## Stručné pokyny

Kompletné pokyny nájdete na opačnej strane tohto letáka.

**1** Skontrolujte prejavy predávkovania a dýchanie

**2** Privolajte RZP



**3** Čo najskôr podajte Nyxoid®



**4** Umiestnite pacienta do stabilizovanej polohy



**5** Sledujte ho a poskytujte mu starostlivosť až do príchodu RZP

**6** Podajte 2. dávku lieku Nyxoid® ak po 2 – 3 minútach nedôjde k žiadnemu zlepšeniu ALEBO ak sa znova objavia príznaky predávkovania



**7** Dbajte o vlastnú bezpečnosť: sledujte akútne abstinenčné príznaky.

**8** Zlikvidujte použitý Nyxoid® a získajte náhradné balenie.

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Pisomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava. tel.: + 421 2 507 01 206. e-mail: [neziaduce.ucinky@sukl.sk](mailto:neziaduce.ucinky@sukl.sk). Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku

Mundipharma Ges. m.b.H. organizačná zložka, Svätoplukova 28 A  
821 08 Bratislava. Tel: +421 2 6381 16 11  
Email: [mundipharma@mundipharma.sk](mailto:mundipharma@mundipharma.sk)  
Nyxoid® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Mundipharma Corporation Limited.  
Dátum zhotovenia: Júl 2025. Pracovný kód: xxxx

**NYXOID®**



## Informačná karta pacienta

**NYXOID®**

Naloxón nosový sprej



## V tomto letáku sa dozviete :

- Ako rozpoznať príznaky predávkovania opioidmi
- Čo robiť
- Ako podať Nyxoid®
- Ako rozpoznať akútne abstinenčné príznaky

## Viac informácií

nájdete na stránke [www.nyxoid.com](http://www.nyxoid.com) alebo naskenujte QR kód.

Stručný návod na použitie nájdete aj na zadnej strane blistra lieku Nyxoid®.

Tento leták je určený pre pacientov alebo opatrovateľov pacientov, ktorým bol predpísaný Nyxoid®.




## Čo robiť: krok za krokom

### 1 Skontrolujte prejavy predávkovania a dýchanie.

- **Opatrne sa priblížte.** Skontrolujte prípadné nebezpečenstvá, ako napríklad injekčný materiál, ktorý by mohol ležať v okolí.
- **Skontrolujte, či postihnutý reaguje,** aby ste zistili, či je pri vedomí. Môžete:
  - zvolať jeho meno;
  - jemne ním potriať za ramená;
  - prihovoriť sa mu nahlas do ucha;
  - pomasírovať mu hrudnú kosť (sternum);
  - ostro mu zoštipnúť ucho alebo nechové lôžko.
- **Skontrolujte dýchacie cesty a dýchanie.**
  - **Odstráňte z úst a nosa** akékoľvek prekážky.
  - **Kontrolujte dýchanie** počas 10 sekúnd. Nadvíhuje sa hrudník? Počujete, ako postihnutý dýcha? Cítite jeho dych na svojom líci?
- **Skontrolujte prejavy predávkovania,** ako sú nasledovné:
  - žiadna reakcia na dotyk alebo zvuk;
  - pomalé, nepravidelné dýchanie alebo žiadne dýchanie;
  - chrápčanie, lapanie po dychu alebo hltanie vzduchu;
  - modré alebo fialové nechty na rukách alebo pery;
  - veľmi malé zrenice.

### 2 Privolajte RZP.

Vždy bezodkladne privolajte RZP, aj keď sa postihnutý preberie.



! **Nyxoid® neslúži ako náhrada za lekársku starostlivosť prve pomocí ani za základnú podporu života (ako je KPR).**

- Ak je to možné, dajte telefón na hlasitý odposluch, aby ste mali voľné ruky.
- **Poskytnite záchrannej zdravotnej službe čo najviac informácií,** ako je napríklad:
  - vaša presná poloha a PSČ (ak ho poznáte);
  - aké látky si myslíte, že mohol postihnutý užiť;
  - či je postihnutý pri vedomí a dýcha;
  - váš úmysel podať postihnutému sprej Nyxoid®.

### 3 Čo najskôr podajte 1 dávku spreja Nyxoid®


Každý nosový sprej obsahuje len jednu dávku.



Odlúpte zadnú stranu obalu spreja Nyxoid®. Vyberte nosový sprej a položte ho tak, aby ste ho mali na dosah.




Položte postihnutého na chrbát. Podoprite mu zadnú stranu krku tak, aby mal hlavu zaklonenú dozadu. Odstráňte všetko, čo by mu mohlo blokovat nos.



Podržte sprej tak, ako je to znázornené – ukazovák a prostredník na stranách trysky, palec pripravený na stlačenie piesta.

! Sprej pred použitím nestláčajte s cieľom ho natlakovať alebo otestovať.




Opatrne vložte trysku spreja do jednej nosovej dierky. Silno stlačte piest tak, aby ste počuli cvaknutie, čo signalizuje podanie dávky. Vyberte trysku z nosovej dierky. Ak je to možné, poznačte si, do ktorej nosovej dierky ste podali dávku.

### 4 Uložte postihnutého do stabilizovanej polohy.



Rameno postihnutého nachádzajúce sa najbližšie k vám zohnite tak, a by s jeho telom zvieralo pravý uhol.



Druhé rameno preložte cez jeho hrudník. Chrbát ruky postihnutého priložte k lícu.



Uchopte vzdialenejšiu nohu postihnutého nad kolenom. Nadvíhajte mu koleno. Pretočte postihnutého k sebe, tak aby ležal na boku.

Podoprite mu hlavu tak, aby mal chrbát ruky stále na líci.



Konečná poloha: Ruka podopiera hlavu.

Horná noha je ohnutá v bedre a kolene.o

### 5 Sledujte postihnutého až do príchodu pomoci.

- **Zostaňte s postihnutým.** Pozorujte, či sa zlepšilo jeho dýchanie a či reaguje na zvuky a dotyk.
- Ak nie je postihnutý pri vedomí a nedýcha normálne, použite základnú podporu života (ako je KPR), ak ste na to vyškolení.\*

! **Dávajte pozor – hoci sa postihnutý preberie, znova môže stratiť vedomie a prestať dýchať.**

### 6 Žiadna reakcia? Podajte 2. dávku.

- Ak **po 2 – 3 minútach** nedôjde k žiadnemu zlepšeniu alebo ak sa znova objavia príznaky predávkovania: **aplikujte nový sprej Nyxoid® do druhej nosovej dierky.** Môžete tak urobiť, keď je postihnutý v stabilizovanej polohe.

### 7 Dbajte o vlastnú bezpečnosť.

- Nyxoid® môže vyvolať **akútne abstinenčné príznaky**, ak je postihnutý závislý na opioidoch. Tieto príznaky môžu zahŕňať nasledovné:

- bolesti a kŕče v tele;
- vracanie, nevoľnosť, hnačka;
- horúčka, výtok z nosa alebo kýchanie;
- potenie, chvenie alebo triaška;
- nervozita alebo podráždenie.

Niektorí ľudia sa môžu po prebratí chovať agresívne.

! **Dbajte o vašu vlastnú bezpečnosť.**

### 8 Po príjazde RZP

**Ihneď informujte záchranárov o tom, čo sa stalo a že ste postihnutému podali Nyxoid®.** Odovzdajte im všetky použité spreje Nyxoid®.

#### Likvidácia použitých nosových sprejov

Ak zabudnete odovzdať použité spreje záchranárom, odovzdajte ich zdravotníckemu pracovníkovi alebo lekárnikovi a postarajte sa o náhradu. **Nikdy** nelikvidujte spreje odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

\*Viac informácií o školení zameranom na základnú podporu života si pozrite na stránke organizácie Resuscitation Council <https://www.resus.org.uk/#>.