

Qu'est-ce que Nyxoid®?

Nyxoid® est un pulvérisateur nasal à dose unique destiné au traitement d'urgence d'un surdosage aux opioïdes (comme l'héroïne, la méthadone, le fentanyl, l'oxycodone, la buprénorphine et la morphine). Chaque boîte contient **deux pulvérisateurs (2 doses uniques)**.

Nyxoid® ne remplace pas les soins médicaux d'urgence.

Toute personne à risque de surdosage aux opioïdes devrait toujours avoir Nyxoid® avec elle. Il est important que les aidants, comme la famille proche ou les amis, sachent où trouver Nyxoid® en cas d'urgence.

Quand utiliser Nyxoid®?

Si vous savez ou suspectez que quelqu'un présente un surdosage aux opioïdes, utilisez Nyxoid® le plus vite possible comme décrit dans cette brochure.


- Appellez TOUJOURS les secours d'urgence immédiatement**, même si la personne se réveille: elle peut de nouveau perdre connaissance et cesser de respirer
- Attention:** une personne ayant reçu Nyxoid® peut présenter des symptômes de sevrage aigus. Veillez à votre propre sécurité.

Si vous emportez Nyxoid® avec vous...

Mettez un rappel dans votre calendrier 1 mois avant la date d'expiration afin de pouvoir acheter une boîte de remplacement à temps.

Comment fonctionne Nyxoid®?

Nyxoid® contient de la naloxone, qui bloque temporairement l'action des opioïdes. La naloxone déplace les opioïdes des sites de liaison correspondants (récepteurs) dans le corps et le cerveau.



Référence rapide

Des instructions complètes sont fournies au verso de cette brochure.

- 1 Vérifiez la présence de signes de surdosage et la respiration.
- 2 Appelez les secours médicaux 112
- 3 Administrez Nyxoid® le plus vite possible
- 4 Placez la personne en position latérale de sécurité
- 5 Surveillez et soutenez la personne jusqu'à l'arrivée des services de secours
- 6 Donnez la 2^e dose de Nyxoid® en l'absence d'amélioration après 2 à 3 minutes OU en cas de réapparition des symptômes de surdosage.
- 7 Veillez à votre propre sécurité: Surveillez l'apparition de symptômes de sevrage aigus.
- 8 Jetez le Nyxoid® usagés et veillez à les remplacer.

Notification des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également voir les effets secondaires directement sur <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/patienten-innen.html>. En signalant les effets secondaires, vous pouvez contribuer à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

Mundipharma Medical Company
St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel
Tel: +41 61 205 11 11, Email: info@mundipharma.ch

Nyxoid® est une marque déposée de Mundipharma Corporation Limited.

Date de préparation: 08.2026
Job Code: GBL-S-NYX-2500021

NYXOID®



NYXOID®

Naxolone Pulvérisateur nasal



Cette brochure vous explique:

- Comment reconnaître les symptômes de surdosage aux opioïdes
- Que faire
- Comment administrer Nyxoid®
- Comment reconnaître les symptômes de sevrage aigus

Pour plus d'informations

Rendez-vous sur www.nyxoid.com ou scannez le code QR.

Un guide de référence rapide est également imprimé au dos de blister Nyxoid®.




Que faire: étape par étape

1 Vérifiez la présence de signes de surdosage et la respiration.

- **Approchez avec prudence.** Vérifiez s'il y a des éléments dangereux, comme du matériel d'injection près de la personne.
- **Vérifiez si la personne répond** afin de déterminer si elle est consciente. Pour ce faire, vous pouvez:
 - crier son nom
 - secouer doucement ses épaules
 - parler fort dans ses oreilles
 - frotter sa poitrine (au niveau du sternum)
 - pincer ses oreilles ou le lit de ses ongles.
- **Vérifiez les voies aériennes et la respiration.**
 - **Libérez la bouche et le nez** de toute obstruction.
 - Pendant 10 secondes, **vérifiez la respiration** — la poitrine bouge-t-elle? Entendez-vous sa respiration? Sentez-vous son souffle sur votre joue?
- **Vérifiez la présence de signes de surdosage**, comme:
 - aucune réponse au toucher ou au bruit
 - respiration lente, irrégulière ou aucune respiration
 - ronflement, halètement ou déglutition
 - ongles ou lèvres bleus ou violets
 - petites pupilles.

2 Appelez les secours médicaux (112).

Appelez toujours les services d'urgence immédiatement, même si la personne se réveille.




! Nyxoid® ne remplace pas les soins médicaux d'urgence ou les mesures de secours (comme un massage cardio-pulmonaire).

- Si possible, allumez le haut-parleur de votre téléphone pour avoir les mains libres.
- **Fournir aux services d'urgence autant d'informations que possible, notamment:**
 - Votre position exacte et votre code postal (s'il vous le connaissez),
 - Quelles substances vous pensez que la personne a prises,
 - Si la personne est consciente et respire,
 - Que vous avez l'intention de donner à la personne le pulvérisateur Nyxoid®.

3 Donnez 1 pulvérisation de Nyxoid® le plus vite possible.


Chaque pulvérisateur nasal contient **une seule dose**.



Enlevez la pellicule protectrice au dos de l'emballage de Nyxoid®. Retirez le pulvérisateur nasal et placez-le à portée de main.




Allongez la personne sur le dos. Soutenez sa nuque et inclinez légèrement sa tête en arrière. Libérez le nez de toute obstruction visible.



Tenez le pulvérisateur comme Indiqué: deux doigts de part et d'autre de l'embout, le pouce prêt à appuyer sur le piston.

! N'appuyez pas pour amorcer ou tester Nyxoid® avant de l'utiliser.




Insérez délicatement l'embout du dispositif dans une narine. Appuyez fermement sur le piston jusqu'au clic pour administrer la dose. Retirez l'embout de la narine. Si possible, notez quelle narine a été utilisée.

4 Placez la personne en position latérale de sécurité.



Inclinez la tête (doucement) vers l'arrière. Soutenez la tête en laissant la main de la personne sur la joue.



Partie supérieure de la jambe fléchie au niveau de la hanche et du genou.

5 Surveillez-le jusqu'à l'arrivée des secours.

- **Restez avec la personne.** Surveillez une amélioration de la respiration et de la réaction au bruit et au toucher.
- Si la personne est inconsciente et ne respire pas normalement, si vous êtes formé(e) à cela, commencez des mesures de réanimation (comme le massage cardio-pulmonaire).
- Pour plus d'informations sur les mesures de réanimation, vous pouvez contacter à l'avance la Croix-Rouge Suisse, par exemple.

! Même si la personne se réveille, elle peut de nouveau perdre conscience et cesser de respirer

6 Pas de réponse? Administrez la 2^e dose.

- Si l'état de la personne ne s'améliore pas **dans les 2 à 3 minutes**, ou si les symptômes de surdosage réapparaissent: **utilisez le 2^e pulvérisateur de Nyxoid® dans l'autre narine**. Cela peut être réalisé alors que la personne est en position latérale de sécurité.

7 Veillez à votre propre sécurité.

- Nyxoid® peut entraîner des **symptômes de sevrage aigus** si la personne est dépendante aux opioïdes. Les symptômes peuvent inclure:
 - douleurs et crampes dans tout le corps
 - nausées, vomissements, diarrhées
 - fièvre, écoulement nasal ou éternuements
 - transpiration, frissons ou tremblements
 - nervosité ou irritabilité

Certaines personnes peuvent faire preuve d'agressivité lors de leur réveil.

! Veillez à votre propre sécurité.

8 À l'arrivée des secours

Informez immédiatement l'équipe de secours de ce qui s'est passé et du fait que vous avez administré Nyxoid®. Donnez-leur le ou les pulvérisateur(s) de Nyxoid® usagés.

Élimination des pulvérisateurs nasaux usagés

Si vous oubliez de donner les pulvérisateurs à l'équipe de secours, remettez-les à un professionnel de santé ou pharmacien et veillez à ce qu'ils soient remplacés. Ne jetez **jamais** les pulvérisateurs au tout-à-égouts ou avec les déchets ménagers.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système de pharmacovigilance de Swissmedic, site Internet : <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/patienten-innen.html>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.