

Che cos'è Nyxoid®?

Nyxoid® è uno spray nasale monodose per il trattamento di emergenza in caso di sovradosaggio di oppioidi (come eroina, metadone, fentanil, ossicodone, buprenorfina o morfina). Ogni confezione contiene **2 spray nasali (ciascuno monodose)**.

Nyxoid® non si sostituisce alle cure mediche di emergenza.

Ogni persona a rischio di un sovradosaggio di oppioidi, deve portare Nyxoid® sempre con sé. Chi si prende cura della persona, come i familiari o gli amici, deve sempre sapere dove si trova Nyxoid® in caso di emergenza.

Quando si usa Nyxoid®?

Se si è a conoscenza o si sospetta un sovradosaggio da oppioidi, utilizzare Nyxoid® appena possibile come descritto in questa brochure.

Chiamare SEMPRE il servizio medico di emergenza immediatamente, anche quando la persona si sveglia, perde nuovamente conoscenza e smette di respirare.


Attenzione: una persona che ha ricevuto Nyxoid® potrebbe sviluppare sintomi di astinenza acuta. Prestare attenzione alla propria sicurezza.

Se porta con sé Nyxoid®...

Aggiunga un promemoria al calendario 1 mese prima della data di scadenza, in modo da potersi procurare una nuova confezione in tempo.

Come agisce Nyxoid®?

Nyxoid® contiene **naloxone**, che annulla temporaneamente gli effetti degli oppioidi. Il naloxone previene il legame degli oppioidi ai corrispondenti siti (recettori) nel corpo e nel cervello.



Guida di riferimento rapido

Le istruzioni complete sono disponibili sull'altro lato di questa brochure.

- 1 Verificare segni di sovradosaggio e la respirazione.
- 2 Chiamare il servizio medico di emergenza. 112
- 3 Somministrare Nyxoid® appena possibile.
- 4 Disporre la persona in posizione laterale di sicurezza.
- 5 Osservare e assistere la persona fino all'arrivo del servizio medico di emergenza.
- 6 Somministrare la seconda dose di Nyxoid® SE non vi è alcun miglioramento dopo 2-3 minuti OPPURE se i sintomi di un sovradosaggio si ripresentano.
- 7 Prestare attenzione alla propria sicurezza: prestare attenzione a sintomi di astinenza acuta.
- 8 Smaltire Nyxoid® usato e provvedere alla sostituzione.

Notifica di effetti collaterali

Se osserva effetti indesiderati, si rivolga al suo medico o al suo farmacista. È possibile segnalare gli effetti collaterali anche direttamente all'indirizzo <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/sorveglianza-del-mercato/farmacovigilanza/patienten-innen.html>. La notifica di effetti collaterali può contribuire a fornire maggiori informazioni in materia di sicurezza di questo farmaco.

Mundipharma Medical Company
St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

Tel: +41 61 205 11 11, Email: info@mundipharma.ch

Nyxoid® è un marchio registrato di Mundipharma Corporation Limited.

Data di creazione: 08.2026

Codice del lavoro: GBL-S-NYX-2500024

NYXOID®



NYXOID®

Naxolone, spray nasale



Questa brochure illustra:

- Come riconoscere i sintomi di sovradosaggio di oppioidi
- Cosa fare
- Come somministrare Nyxoid®
- Come riconoscere i sintomi di astinenza acuta

Per ulteriori informazioni

Visitare il sito www.nyxoid.com o effettuare la scansione del codice QR.

Sul retro del blister di Nyxoid® è presente anche una guida di riferimento rapido.




Operazioni da eseguire: Passo dopo passo

1 Verificare la presenza di segni di sovradosaggio e la respirazione.

- **Avvicinarsi con cautela.** Prestare attenzione ai pericoli, come le siringhe che potrebbe trovarsi nelle vicinanze.
- **Verificare la risposta per** vedere se la persona è cosciente. A tal fine:
 - chiamarla per nome
 - scuoterle delicatamente le spalle
 - parlarle ad alta voce nelle orecchie
 - strofinare il torace (sterno)
 - pizzicare l'orecchio o il letto dell'unghia.
- **Verificare le vie aeree e la respirazione.**
 - **Liberare la bocca e il naso** da eventuali ostruzioni.
 - **Verificare il respiro per 10 secondi** - il torace si muove? È possibile udire il rumore della respirazione? Si sente il respiro sulle guance?
- **Verificare la presenza di segni di sovradosaggio**, quali:
 - assenza di risposte al tocco e ai rumori
 - respiro lento e irregolare, assenza di respiro
 - russamento, respiro affannoso o deglutizione
 - oppure unghie o labbra bluastre o violacee
 - pupille molto piccole.

2 Chiamare il servizio medico di emergenza

Chiamare sempre il servizio medico di emergenza, anche se la persona si risveglia.



! Nyxoid® non sostituisce il trattamento da parte del servizio medico di emergenza o le procedure salvavita (come il massaggio cardiopolmonare).

- Se possibile, attivare il vivavoce sul telefono per tenere le mani libere.
- **Fornire al servizio medico di emergenza quante più informazioni possibili**, tra cui:
 - luogo esatto e codice postale (se noto),
 - il nome delle sostanze che si ritiene che la persona abbia assunto,
 - se la persona è cosciente e respira,
 - che si intende di somministrare alla persona lo spray Nyxoid®.

3 Somministrare 1 dose di spray Nyxoid® appena possibile.


Ogni spray nasale contiene **una sola dose**.



Staccare la parte posteriore della confezione di Nyxoid®. Estrarre lo spray nasale e tenerlo a portata di mano.




Far stendere il paziente sulla schiena. Sostenere la nuca e inclinare leggermente la testa all'indietro. Rimuovere tutto ciò che blocca il naso della persona.



Tenere lo spray come illustrato: con l'ugello tra l'indice e il medio e il pollice sullo stantuffo.

! Non premere prima dell'uso per attivarlo.



Inserire delicatamente l'ugello in una narice. Premere con fermezza lo stantuffo fino a quando non si avverte uno scatto e la dose viene somministrata. Quindi, rimuovere l'ugello dalla narice. Se possibile, prendere nota della narice in cui è stata somministrata la dose.

4 Disporre la persona in posizione stabile.



Afferrare il braccio più vicino e posizionarlo ad angolo retto con il palmo della mano rivolto verso l'alto.



Piegare l'altro braccio sul torace e il dorso della mano contro la guancia.



Afferrare la gamba più lontana, direttamente sopra il ginocchio. Sollevare il ginocchio. Far voltare la persona di lato.



Posizione finale: La mano sostiene la testa.

Inclinare la tête (doucement) vers l'arrière. Soutenez la tête en laissant la main de la personne sur la joue.

La parte superiore della gamba è piegata in modo che il ginocchio piegato e l'anca formino un angolo retto.

5 Monitorare la persona fino all'arrivo dei soccorsi.

- **Restare con la persona.** Osservare se mostra segni di miglioramento a livello di respirazione, di lucidità e di risposta al rumore e al contatto.
- Se la persona è incosciente e non respira normalmente, se si è addestrati a farlo, iniziare con le misure di rianimazione (come il massaggio cardiaco e polmonare).
- Per ulteriori informazioni sulle misure di rianimazione, è possibile contattare prima, ad esempio, la Croce Rossa Svizzera.

! Anche se la persona si sveglia, potrebbe accadere che perda nuovamente conoscenza e smetta di respirare.

6 Nessun miglioramento? Somministrare una seconda dose.

- Se la persona non sta meglio **entro 2-3 minuti** o se i sintomi di sovradosaggio si ripresentano: **Somministrare un altro spray Nyxoid® nell'altra narice.** È possibile farlo mentre la persona si trova in una posizione laterale di sicurezza.

7 Prestare attenzione alla propria sicurezza.

- Nyxoid® può causare **sintomi di astinenza acuta** in soggetti dipendenti da oppioidi. I sintomi possono includere:
 - Dolori in tutto il corpo e crampi
 - Nausea, vomito, diarrea
 - Febbre, naso che cola o starnuti
 - Sudorazione, pelle d'oca o brividi
 - Nervosismo o irritabilità

Alcuni soggetti possono reagire in modo aggressivo al risveglio.

! Prestare attenzione alla propria sicurezza.

8 All'arrivo del servizio medico di emergenza.

Informare immediatamente il servizio medico di emergenza dell'accaduto e che ha somministrato Nyxoid®. Consegni gli spray Nyxoid® usati.

Smaltimento degli spray nasali usati

Se dimentica di consegnare gli spray usati al servizio medico di emergenza, li consegnerà a un medico o un farmacista e ne organizzi la sostituzione. Non getti mai gli spray nelle acque reflue o nei rifiuti domestici.