

Co to jest lek Nyxoid®?

Lek Nyxoid® to jednodawkowy aerozol do nosa przeznaczony do stosowania w postępowaniu ratunkowym po przedawkowaniu leków opioidowych (takich jak heroina, metadon, fentanyl, oksykodon, buprenorfina lub morfina). Każde opakowanie zawiera 2 aerozole do nosa (2 pojedyncze dawki).

Lek Nyxoid® nie zastępuje opieki medycznej w nagłych przypadkach.

Lek Nyxoid® powinna mieć przy sobie każda osoba zagrożona przedawkowaniem opioidów. Opiekunowie, tacy jak bliska rodzina lub przyjaciele, powinni wiedzieć, gdzie znaleźć lek Nyxoid® w nagłych przypadkach.

Kiedy stosować lek Nyxoid®

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś przedawkował lek opioidowy, zastosuj lek Nyxoid®, tak szybko jak to możliwe, zgodnie z opisem na drugiej stronie tej ulotki.

! ZAWSZE natychmiast wzywaj pogotowie ratunkowe, nawet jeśli dana osoba się obudzi – może ponownie stracić przytomność i przestać oddychać.


! Zachowaj ostrożność: u osoby leczonej lekiem Nyxoid® mogą wystąpić ostre objawy odstawienia, które mogą być niebezpieczne.

Jeśli masz przy sobie lek Nyxoid®...

Ustaw alert w swoim kalendarzu na 1 miesiąc przed upływem terminu ważności leku Nyxoid®. Następnie zorganizuj wymianę.

Jak działa lek Nyxoid®?

Lek Nyxoid® zawiera substancję czynną **nalokson**, która czasowo odwraca działanie leków opioidowych. Nalokson działa poprzez wypieranie cząsteczek leku opioidowego z ich receptorów w mózgu i ciele.



Skrócone informacje:

Pełne instrukcje znajdują się na drugiej stronie tej ulotki.

1 Sprawdź, czy nie występują oznaki przedawkowania i czy osoba oddycha

2 Wezwij pogotowie ratunkowe

3 Podaj lek Nyxoid® tak szybko jak to możliwe

4 Ułóż w pozycji bocznej ustalonej

5 Monitoruj i udzielaj wsparcia do czasu przybycia pogotowia ratunkowego

6 Podaj drugą dawkę leku Nyxoid® jeśli nie ma poprawy po 2–3 minutach LUB objawy przedawkowania powrócą

7 Zadbaj o swoje bezpieczeństwo osobiste: zwróć uwagę na ostre objawy odstawienia

8 Wyrzucić zużyty lek Nyxoid® i zastąp nowym

Wszelkie podejrzewane działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa <https://smz2.uzdrowie.gov.pl/> lub podmiotu odpowiedzialnego Mundipharma Corporation Limited, e-mail: drugsafety@mundipharma.pl



Nyxoid® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mundipharma Corporation Limited.

Mundipharma Polska Sp. z o.o.
Data przygotowania: 04.2026 | Kod pracy: GBL-S-NYX-2600008



NYXOID®
naloxone



Z tej ulotki dowiesz się:

- Jak rozpoznać objawy przedawkowania opioidów
- Co robić
- Jak podawać lek Nyxoid®
- Jak rozpoznać ostre objawy odstawienia

Po więcej informacji

Odwiedź www.nyxoid.com

Na odwrocie blistra leku Nyxoid® znajduje się także skrócona instrukcja, jak podawać lek.

Niniejsza ulotka przeznaczona jest dla pacjentów, którym przepisano lek Nyxoid® lub ich opiekunów.




Co zrobić: krok po kroku

1 Sprawdź, czy nie występują oznaki przedawkowania i czy osoba oddycha

- **Podchodź ostrożnie.** Sprawdź, czy nie występują zagrożenia, takie jak materiały służące do wstrzykiwania, które mogą znajdować się w pobliżu
- **Sprawdź reakcję.** czy dana osoba jest przytomna. Możesz:
 - krzyknąć jej imię
 - delikatnie potrząsnąć za ramiona
 - mówić głośno do ucha
 - pocierać mostek
 - uszczypnąć ucho lub podstawę paznokcia
- **Sprawdź drogi oddechowe i oddech**
 - Oczyszczyć jamę ustną i nos z wszelkich blokad
 - Przez 10 sekund sprawdzaj oddech – czy klatka piersiowa się porusza? Czy słyszysz odgłos oddychania? Czy czujesz oddech na policzku?
- **Sprawdź, czy nie występują oznaki przedawkowania,** takie jak:
 - brak reakcji na dotyk lub dźwięki
 - powolny, nierówny oddech lub jego brak
 - chrapanie, dyszenie lub przełykanie
 - niebieskie lub fioletowe paznokcie lub usta
 - zwężone źrenice

2 Wezwij pogotowie ratunkowe

- ! **Zawsze natychmiast wzywaj** pogotowie ratunkowe, nawet jeśli dana osoba się obudzi.




Lek Nyxoid® nie zastępuje opieki medycznej w nagłych przypadkach ani podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa).

- Jeśli to możliwe, przełącz telefon w tryb głośnomówiący, aby mieć wolne ręce
- **Przełącz pogotowiu ratunkowemu jak najwięcej informacji,** w tym:
 - Twoją dokładną lokalizację i kod pocztowy (jeśli jest znany)
 - jakie substancje Twoim zdaniem mogła zażywać dana osoba
 - czy dana osoba jest przytomna i oddycha
 - że planujesz podać lek Nyxoid® w postaci aerozolu

3 Podaj lek Nyxoid® tak szybko jak to możliwe


Każdy aerozol do nosa zawiera tylko jedną dawkę.



Oderwij tylną część pojemnika Nyxoid®. Wyjmij aerozol do nosa i umieść go w łatwo dostępnym miejscu.




Połóż osobę na plecach. Podeprzyj kark i pozwól głowie odchylić się do tyłu. Usuń wszystko, co blokuje nos.



Nie naciskać jeszcze

Przytrzymaj aerozol w sposób pokazany na rysunku — pierwsze dwa palce po obu stronach dyszy, kciuk gotowy do wciśnięcia tłoka.

! Nie naciskać w celu przygotowania lub przetestowania przed użyciem!



Naciskać

"Kliknij"

Delikatnie wsuń dyszę rozpylającą do jednego nozdrza. Mocno naciśnij tłok, aż usłyszysz kliknięcie i podanie dawki. Wyjmij końcówkę z nozdrza. Jeśli to możliwe, zanotuj, którego nozdrza użyłeś.

4 Ułóż w pozycji bocznej ustalonej



Umieść najbliższe ramię pod kątem prostym do ciała, z ramieniem zgiętym



Przełóż drugie ramię na klatkę piersiową. Połóż wierzch dłoni osoby na policzku



Chwyc dalszą nogę tuż nad kolaniem. Podnieś kolano. Przeturlaj osobę do siebie, na bok



Podeprzyj głowę, trzymając wierzch dłoni na policzku

Górna noga zgięta w biodrze i kolanie

5 Monitoruj do czasu przybycia pomocy

- **Pozostań z tą osobą.** Obserwuj poprawę w oddychaniu oraz reakcję na dźwięk i dotyk
- Jeśli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha normalnie, zapewnij podstawowe środki resuscytacyjne (takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa), jeśli jesteś do tego przeszkolony*
- Bądź czujny — nawet jeśli się obudzi, może ponownie stracić przytomność i przestać oddychać

6 Brak odpowiedzi? Podaj drugą dawkę

- Jeśli po 2–3 minutach nie nastąpi poprawa lub jeśli objawy przedawkowania powrócą: zastosuj nowy aerozol Nyxoid® do drugiego otworu nosowego. Możesz to zrobić, gdy osoba znajduje się w pozycji bocznej ustalonej

7 Zadbaj o własne bezpieczeństwo

- Lek Nyxoid® może powodować ostre objawy odstawienia, jeśli dana osoba jest uzależniona od leków opioidowych. Objawy mogą obejmować:
 - bóle i skurcze ciała
 - wymioty, nudności, biegunkę
 - gorączkę, katar lub kichanie
 - pocenie się, dreszcze lub drżenie
 - nerwowość lub drażliwość

Niektóre osoby po przebudzeniu mogą zachowywać się agresywnie.

! **Zadbaj o własne bezpieczeństwo.**

8 Kiedy przyjedzie pogotowie ratunkowe

- **Natychmiast powiedz im, co się stało i że podałeś lek Nyxoid®** Przekaż im zużyte aerozole leku Nyxoid®

Utylizacja zużytych aerozoli do nosa

Jeśli zapomnisz oddać zużyte aerozole ratownikom medycznym, przekaz je pracownikowi fachowego personelu medycznego lub farmaceutyce i zorganizuj wymianę. Nigdy nie wyrzucaj aerozoli do kanalizacji lub odpadów domowych.

*Więcej informacji na temat szkoleń w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych można znaleźć w Radzie Resuscytacji <https://www.prc.krakow.pl/>