

## Što je lijek Nyxoid?

Lijek Nyxoid je sprej za nos u jednodoznom spremniku koji se koristi za hitno liječenje predoziranja opioidima ili mogućeg predoziranja opioidima u odraslih i adolescenata od navršene 14. godine (opioidi kao što su heroin, metadon, fentanil, oksikodon, buprenorfin ili morfin). Jedno pakiranje sadrži 2 spreja za nos (2 pojedinačne doze).

Lijek Nyxoid nije zamjena za hitnu medicinsku skrb.

Lijek Nyxoid treba sa sobom nositi svatko tko je pod rizikom od predoziranja opioidom. Skrbnici, primjerice članovi uže obitelji ili prijatelji, trebali bi znati gdje mogu pronaći lijek Nyxoid u slučaju hitnosti.

### Kada primijeniti lijek Nyxoid

Ako znate ili posumnjate da se netko predozirao opioidom, primijenite lijek Nyxoid što je prije moguće onako kako je opisano na drugoj strani ovog letka.

! **UVIJEK morate odmah pozvati hitnu pomoć**, čak i ako se osoba probudi - može ponovno izgubiti svijest i prestati disati.


! **Budite oprezni:** osoba kojoj se primijeni lijek Nyxoid može pokazivati akutne simptome ustezanja, što može biti opasno.

### Ako imate lijek Nyxoid...

Postavite podsjetnik u kalendaru mjesec dana prije isteka roka valjanosti lijeka Nyxoid, a zatim s liječnikom dogovorite nabavu novog pakiranja.

## Kako lijek Nyxoid djeluje?

Lijek Nyxoid sadrži **nalokson**, koji privremeno poništava učinak opioidnih lijekova. Nalokson djeluje tako da istiskuje molekule opioidnog lijeka iz njihovih receptora u mozgu i drugdje u tijelu.



## Brzi vodič

Za cjelovite upute pogledajte drugu stranu ove kartice.

**1** Provjerite disanje i je li osoba pri svijesti te utvrdite postoje li znakovi predoziranja

**2** Pozovite hitnu pomoć



**3** Primijenite lijek Nyxoid što je prije moguće



**4** Namjestite osobu u bočni položaj



**5** Pratite stanje osobe i pružajte potporu dok ne stigne hitna pomoć

**6** Primijenite drugu dozu lijeka Nyxoid ako se bolesnikovo stanje ne poboljša nakon 2-3 minute ili ako se simptomi predoziranja vrate



**7** Pobrinite se za vlastitu sigurnost: pripazite na akutne simptome ustezanja

**8** Zbrinite upotrijebljeni lijek Nyxoid i nabavite novo pakiranje

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr). Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Medis Adria d.o.o.  
Buzinska cesta 58, Zagreb  
Tel: + 385 (0) 1 230 34 46  
[medis.hr@medis.com](mailto:medis.hr@medis.com)  
Interni kod: SciA-NYX-2400042

**MEDIS**  
**NYXOID**  
mundi pharma

verzija 2; lipanj 2026.

Kartica s informacijama  
za bolesnika / skrbnika

**NYXOID**<sup>®</sup>  
nalokson



Ova kartica s informacijama za bolesnika ili skrbnika predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Nyxoid u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na [www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova](http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova)).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Za više informacija posjetite  
[www.nyxoid.com](http://www.nyxoid.com)

Brzi vodič nalazi se i na poleđini spremnika lijeka Nyxoid.




## Što učiniti: korak po korak

### 1 Utvrdite ima li znakova predoziranja

- **Oprezno pristupite osobi.** Provjerite ima li u blizini opasnih predmeta, kao što je pribor za injiciranje.
- **Provjerite odgovara li osoba,** kako biste vidjeli je li osoba pri svijesti. Možete:
  - viknuti njeno ime
  - blago je protresti za ramena
  - glasno joj govoriti u uho
  - protrljati prsnu kost (sternum)
  - uštipnuti je za uho ili ležište nokta na prstu ruke
- **Provjerite dišne puteve i disanje**
  - **Uklonite iz usta i nosa sve strane tvari**
  - 10 sekundi **provjeravajte disanje** – Pomiču li se prsa? Čujete li zvuk disanja? Osjećate li dah na obrazu?
- **Provjerite ima li znakova predoziranja,** kao što su:
  - izostanak reakcije na dodir ili zvukove
  - sporo, neravnomjerno disanje ili izostanak disanja
  - hrcanje, dahtanje ili gutanje zraka
  - plavi ili ljubičasti nokti prstiju ruku ili usne
  - sužene zjenice

### 2 Pozovite hitnu pomoć

Uvijek odmah nazovite hitnu pomoć, čak i ako se osoba probudi.




! Lijek Nyxoid nije zamjena za hitnu medicinsku pomoć ni mjere osnovnog održavanja života (kao što je kardiopulmonalno oživljavanje)

- Ako je moguće, stavite telefon na zvučnik kako bi Vam ruke bile slobodne.
- **Dajte hitnoj službi što više informacija,** uključujući:
  - točnu lokaciju i poštanski broj (ako ih znate)
  - što mislite da je osoba možda uzela
  - je li osoba pri svijesti i diše li
  - da planirate primijeniti Nyxoid sprej za nos

### 3 Primijenite jedan sprej lijeka Nyxoid što je prije moguće


Svaki sprej za nos sadrži samo jednu dozu.



Odljepite stražnju stranu spremnika lijeka Nyxoid. Izvadite sprej za nos i stavite ga nadohvat ruke.




Polegnite osobu na leđa. Poduprite joj potiljak i zabacite glavu unazad. Uklonite iz nosa sve strane tvari.



Nemojte još pritisnuti

Držite sprej kako je prikazano – kažiprst i srednji prst položite svaki s jedne strane mlaznice, a palac namjestite na klip.

! Nemojte pritiskati sprej radi pripreme ili probe prije upotrebe.



Pritisnite

Nježno umetnite mlaznicu spreja u jednu nosnicu. Čvrsto pritisnite klip sve dok ne čujete klik, što je znak da je doza primijenjena. Izvadite mlaznicu spreja iz nosnice. Po mogućnosti zapamtite u koju ste nosnicu primijenili lijek.

### 4 Položite osobu u bočni položaj



A Postavite bližu ruku pod pravim kutom u odnosu na tijelo i savijte je



B Prebacite drugu ruku preko prsnog koša. Položite nadlanicu uz obraz



C Uхватite udaljeniju nogu odmah iznad koljena. Podignite koljeno. Okrenite osobu prema sebi i postavite je na bok



D Konačni položaj: Šaka podupire glavu

Poduprite glavu, tako da nadlanica ostane ispod obraza

Gornja noga savijena je u kuku i koljenu

### 5 Pratite stanje osobe dok ne stigne pomoć

- **Ostanite uz osobu.** Pratite poboljšava li se disanje te reagira li na zvukove i dodir.
- Ako je osoba bez svijesti i ne diše normalno, primijenite mjere osnovnog održavanja života (kao što je oživljavanje), ako ste obučeni za to\*.
- Budite svjesni — čak i ako se probude, mogu opet pasti u nesvijest i prestati disati.

### 6 Osoba ne reagira? Primijenite drugu dozu

- Ako nema poboljšanja **nakon 2-3 minute** ili ako se simptomi predoziranja vrate: **primijenite novi sprej lijeka Nyxoid u drugu nosnicu.**

To možete učiniti dok je osoba u bočnom položaju.

### 7 Pobrinite se za vlastitu sigurnost

- Ako je osoba ovisna o opioidima, lijek Nyxoid može izazvati **akutne simptome ustezanja**. Simptomi mogu uključivati:
  - bolove i grčeve po tijelu
  - povraćanje, mučninu, proljev
  - vrućicu, curenje iz nosa ili kihanje
  - znojenje, drhtanje ili groznicu
  - nervozu ili razdražljivost

Neke osobe mogu se ponašati agresivno kad se počnu buditi.

! **Pobrinite se za vlastitu sigurnost.**

### 8 Kad stigne hitna pomoć

- **Odmah im recite što se dogodilo i da ste osobi primijenili lijek Nyxoid.** Dajte im sve upotrijebljene spremnike Nyxoid spreja za nos.

### Zbrinjavanje upotrijebljenih sprejeva za nos

Ako zaboravite dati upotrijebljene sprejeve djelatnicima hitne pomoći, dajte ih zdravstvenom radniku ili ljekarniku i dogovorite nabavu novog pakiranja. **Nikada** nemojte bacati sprejeve u otpadne vode ili kućni otpad.

\*Za više informacija o obuci za pružanje mjera osnovnog održavanja života posjetite stranicu: <http://www.hdhm.com.hr/>