

Vad är Nyxoid?

Nyxoid är en nässpray med en enstaka dos för akut användning efter en överdos av opioider (till exempel heroin, metadon, fentanyl, oxikodon, buprenorfin eller morfin). Varje förpackning innehåller 2 sprayer (2 enstaka doser).

Nyxoid ersätter inte akut läkarvård.

Personer som löper risk för att överdosera opioider ska ha med sig Nyxoid. Värdera, till exempel familj eller vänner, ska veta var Nyxoid finns i händelse av en akut situation.

När ska Nyxoid användas

Om du vet eller misstänker att någon har tagit en överdos av en opioid skal du använda Nyxoid på det sätt som beskrivs på andra sidan av detta blad.

! Ring ALLTID omedelbart efter en ambulans, även om personen vaknar – han/hon kan bli medvetslös igen och sluta andas.


! Var försiktig: en person som behandlas med Nyxoid kan få akuta abstinenssymptom och kan blir aggressiv.

Om du har med dig Nyxoid...

Notera i din kalender när dett är 1 månad kvar tills bäst före-datumet på din Nyxoid. Se sedan till att byta ut Nyxoid-förpackningen mot en ny förpackning.

Hur fungerar Nyxoid?

Nyxoid innehåller **naloxon**, som tillfälligt upphäver effekten av opioider. Naloxon verkar genom att tränga undan opioidmolekyler från deras receptorer i hjärnan och kroppen.



Snabbguide

Fullständiga instruktioner finns på andra sidan av detta blad.

1 Kontrollera andningen och om det finns tecken på överdos

2 Ring efter ambulans



3 Ge Nyxoid så snabbt som möjligt



4 Lagg personen i stabilt sidoläge



5 Övervaka och stötta tills ambulansen anländer (t.ex. hjärt-lungräddning)

6 Ge 2:a dosen Nyxoid om ingen förbättring ses efter 2–3 minuter ELLER om symptom på överdos kommer tillbaka



7 Tänk på din egen säkerhet var vaksam på akuta abstinenssymptom

8 Kassera använd Nyxoid och få en ny förpackning

Datum för färdigställande: Mars 2026
Arbetskod: SE/NYXO-18007

Mundipharma Corporation Limited
Nyxoid® är ett registrerat varumärke som tillhör Mundipharma

Lokal kontakt:
Mundipharma AB
Tel: + 46 (0)31 773 75 30
Nordics@mundipharma.dk

NYXOID®
naloxon



Denna broschyr beskriver:

- Hur du känner igen symptomen på en opioidöverdos
- Vad du ska göra
- Hur du ger Nyxoid
- Hur du känner igen akuta abstinenssymptom

För mer information

Besök www.nyxoid.com eller scanna QR-koden.

Det finns också en Snabbguide på baksidan av Nyxoid-blisterförpackningen.




Vad du ska göra: steg för steg

1 Kontrollera andningen och om det finns tecken på överdos

- **Närma dig personen försiktigt.** Kontrollera om det finns faror, till exempel injektionsmaterial bredvid personen.
- **Kontrollera om personen reagerar**, för att se om personen är vid medvetande. Du kan:
 - ropa personens namn
 - skaka axlarna försiktigt
 - tala med hög röst i personens öra
 - gnugga bröstbenet (sternum)
 - nypa personens öra eller nagelbädd på ett finger
- **Kontrollera luftvägar och andning**
 - **Ta bort allt som eventuellt blockerar munnen och näsan**
 - Kontrollera andning i 10 sekunder – rör sig bröstkorgen. Kan du höra andningsljud? Kan du känna andetagerna på kinden?#
- **Kontrollera efter tecken på överdos, t.ex.:**
 - ingen reaktion på beröring eller ljud
 - långsam, ojämn andning eller ingen andning
 - personen snarkar, flämtar eller kippar efter andan
 - blå eller lila fingernaglar/läppar eller små pupiller

2 Ring efter ambulans

Ring alltid omedelbart 112, även om personen vaknar




! Nyxoid ersätter inte akut läkarvård eller första hjälpen (t.ex. hjärt-lungräddning).

- Sätt på högtalaren på din telefon, om du kan, för att ha händerna fria
- **Ge SOS-operatören så mycket information du kan, inklusive:**
 - din exakta position och adress (om du kan den)
 - vilka ämnen du tror personen kan ha tagit
 - om personen är vid medvetande och andas
 - att du planerar att gi Nyxoid-spray

3 Ge 1:a dosen Nyxoid så snabbt som möjligt


Varje nässpray innehåller endast en dos.



Dra av baksidan av Nyxoid-blisterförpackningen. Ta ut nässprayen och placera den inom nära räckhåll.




Lägg personen på rygg. Stöd nacken och låt huvudet luta bakåt. Rensa bort allt du ser som kan blockera näsan.



Håll sprayen som på bilden – pekfinger och långfinger på var sin sida om pipen, tummen redo att trycka på kolven.

! Tryck inte för att testa innan du använder sprayen.




För försiktigt in spraypipen i ena näsborren. Tryck bestämt på kolven tills den klickar till för att ge dosen. Ta ut pipen ur näsborren. Anteckna om möjligt vilken näsborre du använde.


4 Lägg i stabilt sidoläge



Placera närmsta arm i rätt vinkel mot kroppen, med armen böjd




För andra armen över bröstet. Lägg baksidan av personens hand mot kinden



Fatta tag i borte benet precis ovanför knät. Lyft knät. Rulla personen mot dig, till sidoläge

Stöd huvudet, med handens baksida mot kinden



Slutlig position: Hand stödjer huvud

Övre benet böjt vid höft och knä

5 Övervaka tills hjälp anländer

- **Stanna hos personen.** Se om du märker någon förbättring i andningen och personens respons på ljud og beröring.
- Om personen är medvetslös och inte andas normalt ska du ge första hjälpen (t.ex. hjärt-lungräddning)
- Var vaksam – även om personen vaknar kan han/hon bli medvetslös igen och sluta andas.

6 Ingen respons? Ge 2:a dosen

- Om det inte syns någon förbättring efter 2–3 minuter, eller om överdossymptom kommer tillbaka: använd en ny Nyxoid-spray i den andra näsborren. Du kan göra det medan personen ligger i stabilt sidoläge.

7 Tänk på din egen säkerhet

- Nyxoid kan orsaka akuta abstinenssymptom om personen är beroende av opioider. Symptom kan omfatta:
 - värk i kroppen och kramper
 - kräkningar, illamående, diarré
 - feber, snuva eller nysningar
 - svettning, darrningar eller skakningar
 - ångslan eller irritabilitet

Vissa personer kan bli aggressiva när de vaknar.

! Tänk på din egen säkerhet.

8 När ambulansen anländer

- **Berätta omedelbart vad som hänt och att du gett Nyxoid. Ge dem all använd Nyxoid-spray**

Kassering av använd nässpray

Om du glömmer att ge den använda sprayen till ambulanspersonalen ska du ge den till sjukvårds- eller apotekspersonal och se till att du får en ny förpackning. Spola aldrig ner spray i avloppet och kasta den aldrig i hushållssoporna.